

Rapport till hästägare

Hästens namn: **Olsen**
Hästägare: **Peter Simoni Christensen**

Datum för operation: 2026-05-10

Förhistoria/anamnes: Röntgen från polsk veterinär visar benbitar i BB hasleder, som ägaren önskar avlägsnad artroskopiskt.

Diagnos: Hasledsinflammation BB

Operation/åtgärd: Osteokondros (OCD) distal intermediär kam tibia BB hasled (lösa fragment VB) Artroskopi bb hasled. Tydlig osteokondros (OCD) dist intermed kam tibia bb med fragment, ca 5x7 mm hb och 3x2 mm vb samt en del småbitar ("grus"). Dessutom fanns fria fragmenten i central ledavd distalt om tibia nära prox intertarsalled samt medial för medial malleolus i vb, tydligtvis knäckt av intermediär kam. Lite fragment lokaliserat i själve ledkapselficka för proximal intertarsalled distalt vb, uppressat och explorerat med special tänger. Med röntgen guide ses ett lite fragment vb utan för leden vid distal intertarsalled, utan betydelse för prognos. Med en del besvär lossat och avlägsnat alla OCD fragmenten samt krater bb. Rensat upp tibia grundligt med tänger och curetter. En del mjukt nekrotiskt subkondralben. Inga andra fynd, ledbrösket normalt bb. Kraftig diffus synovitis bb, ffa vb. Sköljt och dammsugit grundligt med stor hylsa. Sytt huden med PDS 2-0, 4 portaler totalt. Carbocain i lederna. Kontroll röntgen bekräftade bra resultat.

Instruktioner/ eftervård: Fenylbutazon pulver 1 påse 2 ggr/dag i 10 dagar, ges i munnen. Starta mediciner i kväll. Hästen ska ha bandage i 14 dagar, byte var 3-4 dag efter behov. (Se bifogad information om bandage läggning vid artroskopi av hasled). Operationssåren skall inte rengöras. Stygnen avlägsnas om 12 dagar, 4 ställen. Boxvila i 14 dagar och därefter skritt i 4 veckor (för hand, i "walker" eller på rullmatta) samt i liten hage (5x5 m). Om frågor eller problem uppstår, t ex om hästen blir mera halt eller får feber (normal $\leq 38,0$) vänligen ring lokal veterinär eller veterinär P Brink.

Återbesök: Återbesök rekommenderas hos lokal veterinär om 4 och 8 veckor för bedömning av operationsresultat och vidare plan för rekonvalescensprogram.

Konklusion/prognos: God prognos för full atletisk funktion BB trots fria ledfragmenten VB.

Med vänlig hälsning

Veterinär Palle Brink

Klinikchef Jägersro Hästklinik
PhD, Diplomat ECVS, Spec. hästens sjukdomar